

## Кукурузная листовая совка

*Spodoptera frugiperda* (Smith)

### Страны распространения и возможного заноса:

Бермуды, Канада, США, Мексика, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Содружество Багамских островов, Каймановы острова, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Республика Эль-Сальвадор, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Гаити, Ямайка, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго.

Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гвиана, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.

### Характерная подкарантинная продукция и пути распространения:

Возможен занос с кормовыми культурами, а также их рассадой: капуста (*Brassica*), сладкий перец (*Capsicum annuum*), хлопчатник (*Gossypium hirsutum*), батат (*Ipomoea batatas*), томат (*Solanum lycopersicum*), фасоль (*Phaseolus vulgaris*), баклажан (*Solanum melongena*), хризантемы (*Chrysanthemum*), гвоздики.

### Симптомы повреждений и методы диагностики:

Молодые гусеницы питаются наиболее мягкими частями листьев, скелетируя листовую пластинку. Гусеницы старших возрастов менее избирательны, и могут питаться разными частями растений, могут даже перегрызать стебель растения. Могут быть повреждены также плоды и бутоны. При высокой численности вредителя возможна полная дефолиация растения. В теплицах гусеницы могут сильно повреждать рассаду.



Гусеницы *S. frugiperda*  
(<http://www.eppo.int>)



Повреждения гусеницами *S. frugiperda*  
(<http://www.eppo.int>)



Имаго *S. frugiperda* (<http://www.eppo.int>)



Половой аппарат самца *S. frugiperda*  
(<http://www7.inra.fr>)



Гусеница *S. frugiperda* (<http://pubs.ext.vt.edu>)